

# PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN

## PRIMERAS 72 HORAS DE OCURRIDO EL EVENTO ASALTO SEXUAL

### + Importante!!!

- Profilaxis Post Exposición PPE significa tomar medicamentos contra el VIH dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición al VIH
- La PPE únicamente se utiliza en situaciones de emergencia y no sustituye otros métodos para prevenir el VIH.
- La PPE debe iniciarse dentro de las 72 horas (tres días) después de una posible exposición; cada hora cuenta
- Si se le receta tratamiento PPE, significa que tomará medicamentos contra el VIH durante 28 días.



### +Cuál es el tratamiento PPE?

- Se debe tomar una tableta por día que contiene los siguientes medicamentos: Dolutegravir 50mg, Lamivudina 300mg y Tenofovir 300 mg.
- La dosis es una tableta por día por 28 días.

### + Beneficios del tratamiento

- La PPE es la utilización a corto plazo de los tratamientos antirretrovirales ARV con el fin de reducir la probabilidad de contraer el VIH después de una posible exposición



### + Tratamiento antibiótico

Se utiliza para prevención en caso de infección

Ceftriaxona: 250 mg, dosis única

Azitromicina: 1 g vía oral, dosis única

Metronidazol: 2 g vía oral, dosis única

Se podría anexar un antiemético, debido a que pueden presentarse efectos secundarios gastrointestinales con esta combinación.

### + Vacunas

- Si recibió la primera dosis de vacuna contra Hepatitis B:
- Debe recibir su segunda dosis al primer mes
- Debe recibir su tercera dosis al tercer mes



### + Seguimiento

- Si recibió terapia PPE debe continuar su control y seguimiento, a través de la Consulta Externa de medicina general o especializada, según corresponda del establecimiento en el que fue atendida. Asista a las citas médicas y de Atención Farmacéutica que le asignen.

### + Efectos adversos más frecuentes

- Los medicamentos contra el VIH que se usan en la PPE pueden causar efectos secundarios en algunas personas (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal / cólico intestinal, flatulencia, mareos, dolor de cabeza, insomnio, tos, síntomas nasales, dolor de articulaciones, trastorno muscular, cansancio, malestar general, fiebre)
- Si está tomando tratamiento PPE y tiene efectos secundarios, consulte con su médico o farmacéutico

